



3. ใช้นิ้วมือค่อยๆ กด และคลึงเป็นวงเล็กๆ อย่าง
สม่ำเสมอ กัน รอบๆ เต้านมจากส่วนนอก และ
เห็นอุ้ดของเต้านมเวียนไปรอบๆ เต้านม
เป็นวงกลม (ดังภาพที่ 7) ตรวจให้ทั่วทุกส่วน
ของเต้านม กระทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงหัวนม
ขณะตรวจคลำให้สังเกตว่า มีสิ่งผิดปกติ เช่น
ก้อน ตุ่ม หรือไถแข็ง ในเต้านมหรือไม่



ภาพที่ 7

4. ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ค่อยๆ บีบหัวนม
สังเกตดูว่า มีน้ำเลือด น้ำหนอง หรือน้ำใสๆ
ออกมากหรือไม่

5. เอาแขนลงมาวางไว้ข้างๆ ลำตัว ใช้ฝ่ามือค่อยๆ
ตรวจคลำดูบริเวณรักแร้ (ดังภาพที่ 8) ว่ามีก้อน
แข็ง หรือบวมที่ใด หรือไม่



ภาพที่ 8

ถ้าตรวจพบสิ่งผิดปกติของเต้านม ดังต่อไปนี้

ต้องรีบปรึกษาแพทย์ทันที

- เต้านมทั้ง 2 ข้าง ไม่อุ้ย ในระดับเดียวกัน
- ขนาด / รูปร่างของเต้านม และหัวนม ต่างกัน
อย่างผิดปกติ
- พบรักแร้ หรือเนื้อ ที่เป็นไถแข็งผิดปกติ
- สีของผิวนังบริเวณเต้านม และหัวนมผิดปกติ
- ผิวนังบริเวณเต้านมมีรอยบุ๋ม
- หัวนมถูกดึงรั้งจนผิดปกติ
- มีน้ำเหลือง และเลือดไหลจากหัวนม หรือ
พบรอยแตกบนหัวนม

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลสหospital
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

255/4 ม.9 ซอยพัทยา 4 ถนนพัทยาสาย 2
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร: (66 38) 42-8374 แฟกซ์: (66 38) 42-2773
E-mail : picpih@pih.co.th www.pih.co.th



โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลสหospital
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
PATTAYA INTERNATIONAL HOSPITAL
MEDIUM SIZE GENERAL HOSPITAL

การตรวจ เต้านมด้วยตนเอง



สรุป... ทุกคนควรรู้วิธีการตรวจเต้านมของตนเอง
และควรทำการตรวจเป็นประจำทุกเดือน เพื่อช่วยให้สามารถ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเต้านมที่ผิดไปจากปกติได้ และ
สามารถพบสิ่งผิดปกติของเต้านมได้แล้วรีบให้แพทย์ตรวจ
ก็จะทำให้สามารถวินิจฉัยโรคของเต้านมได้โดยเฉพาะ มะเร็ง
ในระยะแรกเริ่มได้มากขึ้นและเร็วขึ้น

ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่สตรีจะทำการตรวจเต้านมคือ ภายในหลังหมดประจำเดือน ในมenses เพราะเต้านมในระยะนี้มีลักษณะอ่อนตัวมาก ไม่ปาน กดไม่เจ็บ และสามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติได้ง่าย สำหรับสตรีที่เข้าวัยหมดประจำเดือนแล้ว ควรตรวจเต้านมตนเองในวันเดียวกันเป็นประจำทุกเดือน

ในการตรวจเต้านมนั้น สตรีควรเลือกเวลาช่วงสักวันที่ท่านร่างและใช้สถานที่ไม่มีผู้อื่นรบกวนในขณะตรวจ ห้องน้ำหรือห้องนอนเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุด และควรมีกระจกเงาให้มองเห็นเต้านมของตนเอง และควรตรวจเต้านมในที่มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อช่วยให้สามารถตรวจเห็นสิ่งผิดปกติของเต้านมหัวนม ผิวหนังได้ชัดเจน

การตรวจเต้านมตนเอง กระทำได้ทั้งการใช้ตาดู และการใช้มือคลำ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ


ขั้นตอนที่ 1 การตรวจเต้านมหน้ากระจก

เปลื้องเสื้อผ้าส่วนทรวงอกออกจนถึงระดับเอว แล้วนั่งหรือยืนหน้ากระจกการตรวจหน้ากระจกจะกระทำ 3 ท่า คือ

ท่าที่ 1 ปล่อยแขนทั้ง 2 ข้าง ห้อยลงช้าๆ ลำตัว (ดังภาพที่ 1)

ท่าที่ 2 ชูแขนทั้ง 2 ข้าง ขึ้นเหนือศรีษะ (ดังภาพที่ 2)

ท่าที่ 3 เอามือทั้ง 2 ข้าง ห้ามเอวหรือท้าวสะโพก และใช้มือกดบนสะโพกแรงๆ เพื่อให้เกิดการเกร็งและกดตัวของกล้ามเนื้อหน้าอก (ดังภาพที่ 3)




ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจเต้านมในท่านอน ควรเริ่มตรวจเต้านมข้างซ้ายก่อน แล้วจึงเปลี่ยนไปตรวจเต้านมข้างขวาในลักษณะเดียวกัน การตรวจเต้านมในท่านอนจะกระทำ 2 ท่า คือ

ท่าที่ 1 ท่านอนตรวจเต้านมข้างซ้าย นอนราบลงบนเตียงหรือบนพื้น และศรีษะหนุนหมอนใช้ผ้าพับหรือ หมอนใบเล็กๆ รองใต้ไหล่ซ้าย และอาจมีอุปกรณ์รองหนุนใต้ศรีษะใช้มือขวาตรวจคลำบริเวณต่างๆ ของเต้านมข้างซ้ายอย่างมีระบบ (ดังภาพที่ 4)




ภาพที่ 4

ท่าที่ 2 ท่านอนตรวจเต้านมข้างขวาบนราบลงบนเตียงหรือบนพื้น และศรีษะหนุนหมอน ใช้ผ้าพับหรือหมอนเล็กๆ รองใต้ไหล่ขวา และอาจมีอุปกรณ์รองหนุนใต้ศรีษะใช้มือซ้ายตรวจคลำบริเวณต่างๆ ของเต้านมข้างขวาอย่างมีระบบ


การตรวจคลำเต้านมอย่างมีระบบ กระทำดังนี้

1. แบ่งเต้านมข้างที่จะตรวจออกเป็น 4 ส่วน (ดังภาพที่ 5)
 - ส่วนที่ 1 ส่วนบนด้านในซิดกับกระดูกหน้าอก
 - ส่วนที่ 2 ส่วนบนด้านนอกซิดกับแขน
 - ส่วนที่ 3 ส่วนล่างด้านในซิดกับกระดูกหน้าอก
 - ส่วนที่ 4 ส่วนล่างด้านนอกซิดกับแขน



ภาพที่ 5

2. ใช้ฝ่ามือมือตรวจคลำ เต้านมส่วนที่ 1 ก่อน เริ่มคลำจากรอบนอกของเต็ลลัส่วน เข้าไปหาหัวนมจนครบ 4 ส่วน (ดังภาพที่ 6)



ภาพที่ 6