

Brustkrebs


Bei Frauen über 40 ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung. An zweiter Stelle liegt der Gebärmutterhalskrebs.

Anzeichen für Brustkrebs

Achten sollten Frauen auf neu aufgetretene Knoten, Verdichtungen oder Verhärtungen in der Brust oder der Achselhöhle, Einziehung einer Brustwarze, wasserklare oder blutige Absonderungen aus einer Brustwarze, neu auftretende, nicht abklingende Hautrötung oder -schuppung, oder einseitige brennende Schmerzen oder Ziehen.

Früherkennung

- Bluttests
- Mammografie
- Selbstuntersuchung der Brust



Mit Sorgfalt aus dem
Pattaya International Krankenhaus



PATTAYA INTERNATIONAL HOSPITAL
MEDIUM SIZE GENERAL HOSPITAL

Krebs Screening-Programm

Mann Kosten : 2,500 Baht

- AFP Leberkrebs
- CEA Darmkrebs
- PSA Prostatakrebs

Frau Kosten : 3,700 Baht

- AFP Leberkrebs
- CEA Darmkrebs
- PSA Prostatakrebs
- ThinPrep PAP-Test Gebärmutterhalskrebs

Wir behalten uns das Recht vor, die Testserie abgestimmt auf sie zu ändern.

PATTAYA INTERNATIONAL HOSPITAL
MEDIUM SIZE GENERAL HOSPITAL

255/4 Moo 9 Soi Pattaya 4 Pattaya 2nd Rd.
Nongprue Banglamung Chonburi 20150
Tel : (66 38) 428374 Fax : (66 38) 422773
E-mail : picpih@pih.co.th www.pih.co.th

krebs



Heute...Zum Schutz vor Krebs
Medizinische Vorsorge für Sie und Ihre Lieben

Darmkrebs

Mit dem Alter nimmt die Häufigkeit von Darmkrebs zu. Die häufigsten Risikofaktoren sind:


Erblich bedingt (Verwandte von Ihnen sind bereits erkrankt) Primärtumor im Dickdarm hat gestreut

Symptome bei Darmkrebs

1. Bauchschmerzen oder Blut im Stuhl
2. Veränderte Stuhlgewohnheiten
3. Häufige Bauchkrämpfe
4. Gewichtsverlust aus unbekanntem Grund

Früherkennung bei Darmkrebs durch

1. rektale Untersuchung mit dem Finger
2. Nachweis von Blut im Stuhl (Labor)
3. Endoskopische Untersuchung
4. Radiographie des Dickdarms



Gebärmutterhalskrebs

Risikofaktoren

1. Seit Jahren Sex (unter 18 Jahren)
2. Sexuell übertragbare Infektionen
3. Chronische Immunschwäche wie Aids
4. Störungen durch Zervixuntersuchung

Alarmzeichen


1. Blutungen aus der Scheide beim Geschlechtsverkehr
2. Menstruationsbeschwerden
3. Vaginalgeruch mit viel Farbfehler oder Blutkontamination
4. Zwischenblutungen,

Diagnose

1. Die Interne Prüfung
2. Die Kamera Expansion zusammen mit der Abteilung Biopsy Pathologie.

Schutz

1. Besuch des Gynokologen alle 1-3 Jahre.
2. Verwenden Sie Kondome um sexuell übertragbare Infektionen zu vermeiden.
3. Gehen Sie zum Arzt wenn Sie ungewöhnliche Ausflüsse oder abnorme Blutungen aus der Scheide haben.



Leberkrebs

Männer sind häufiger von Leberkrebs betroffen als Frauen.

Ursachen

Risiken im Zusammenhang mit Hepatitis B, Leberegel, Chemikalien, Medikamente, Insektengift, Toxine durch verdorbene Lebensmittel, Impfungen, Spirituosen,

Symptome

- Appetitlosigkeit, Blähungen, Verstopfung
- Müdigkeit, Gewichtsverlust, niedriges Fieber
- Sodbrennen, Schmerzen im rechter Brustkorb
- Gelbsucht, gelbe Augen, Bauchschwellung, geschwollene Beine

Diagnose

- Bluttest zum Nachweis von Hepatitis B, C, HBs Ag oder Nachweis von Antikörpern gegen das Hepatitis-B-Virus
- Untersuchung der Leberfunktion durch den Arzt. (AST/ALT) Bluttest zum Nachweis von AFP

